

【がん種】 胃癌
【レジメン名】 SOX+Nivolumab
【登録番号】 160731
【1コースの期間】 3週間
【投与間隔調整規定】 -1日
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 中等度:エルプラット、軽度:ティーエスワン、最小度:オブジーボ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):エルプラット(漏出時の冷却禁止)、ノンビシカント(非壊死性):オブジーボ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、AST増加、ALT増加、下垂体機能低下症、副腎機能不全、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、高血糖、
 注入に伴う反応、サイトカイン放出症候群、アレルギー反応、疲労、流涙、間質性肺炎、心筋炎、血栓塞栓症、消化管穿孔、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚不全、下痢、便秘、
 末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、注射部位反応、筋肉痛、関節痛、湿疹
【必要な検査】 一般採血、胸部X線、TSH、遊離T3、遊離T4、血糖、コルチゾール、ACTH
【根拠論文】 Ann Oncol 30:250-258, 2019. ONO-4538-37試験。
【点滴の時間】 [day1]4時間05分
【その他】 ティーエスワン投与量:BSA<1.25m2:80mg/日, 1.25m2≤BSA<1.50m2:100mg/日, BSA≥1.50m2:120mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	...	15	...	21	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○							
2	生理食塩液 100mL オブジーボ点滴静注	1 B 360 mg	側管	30分 フィルター使用 シリコン製ポート使用禁止	○							
3	生理食塩液 50mL	1 B	側管	5分	○							
4	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○							
5	5%ブドウ糖液 500mL エルプラット点滴静注液	1 B 130 mg/m2	側管	2時間	○							
6	ティーエスワン配合OD錠 1日目の夕~15日目の朝まで	80 mg/m2/日	内服	1日2回朝食後	△	○	○	○	△			
7	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後	○	○						