

【がん種】 [胃癌](#)
【レジメン名】 SOX+Trastuzumab
【登録番号】 160735
【1コースの期間】 3週間
【投与間隔調整規定】 -1日
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 中等度:エルプラット、軽度:ティーエスワン、最小度:トラスツズマブ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):エルプラット(漏出時の冷却禁止)、ノンビシカント(非壊死性):トラスツズマブ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注入に伴う反応、アレルギー反応、疲労、流涙、間質性肺炎、心不全、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚不全、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、注射部位反応
【必要な検査】 一般採血、心エコー
【根拠論文】 Gastric Cancer 22:1238-1246, 2019. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 85:217-223, 2020.

【点滴の時間】 [day1]初回5時間、2回目～4時間
【その他】 対象患者:HER2+、トラスツズマブ:投与間隔が4週間を超える場合は、8mg/kg/日で投与。
 ティーエスワン投与量:BSA<1.25m²:80mg/日, 1.25m²≤BSA<1.50m²:100mg/日, BSA≥1.50m²:120mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	...	15	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○								
3	生理食塩液 250mL トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水 20mL 初回8mg/kg、2回目～6mg/kg	1 B - mg/kg 1 A	側管	初回90分、2回目～30分 トラスツズマブ溶解用	○								
4	5%ブドウ糖液 500mL エルプラット点滴静注液	1 B 130 mg/m ²	側管	2時間	○								
5	ティーエスワン配合OD錠 1日目の夕～15日目の朝まで	80 mg/m ² /日	内服	1日2回夕食後	△	○	○	○	△				
6	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後	○	○							