【がん種】 胃癌
【レジメン名】 S-1+CDDP
【登録番号】 160706
【1コースの期間】 5週間
【総コース数】 進行・再発：PDまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、軽度：ティーエスワン
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 9:215-221, 2008.

【点滴の時間】 [day8～]73時間
【費用】 編集中
【その他】 ティーエスワン投与量：BSA＜1.25m2：80mg/日, 1.25m2≦BSA＜1.50m2：100mg/日, BSA≧1.50m2：120mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					1	…	8	9	10	11	…	22	…	35
1	ティーエスワン配合OD錠 1日目の夕～22日目の朝まで	80 mg/m2/日	内服	1日2回朝夕食後	△	○	○	○	○	○	○	△		
2	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ			○							
3	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:00～			○							
4	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分			○							
5	生理食塩液 250mL プロイメンド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分			○							
6	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分			○							
7	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分			○							
8	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分			○							
9	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 60 mg/m2	側管	90分 遮光			○							
10	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分			○							
11	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間　残破棄			○							
12	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間 AM0:00～				○	○	○				
13	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分 AM6:00～				○						
14	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分 AM6:00～					○	○				
15	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間				○	○					
16	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間				○	○					