

【がん種】 [胃癌](#)
【レジメン名】 S-1+DTX②
【登録番号】 160712
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 術後補助:6コースまで(S-1+DTX①術後補助1コース目 終了後から開始し、S-1+DTX②終了後にS-1を施行する)、進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:ドセタキセル, ティーエスワン
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ドセタキセル
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Cancer Res Clin Oncol 140:319-328, 2014. J Clin Oncol 37:1296-1304, 2019.

【点滴の時間】 [day1]2時間30分
【費用】 編集中
【その他】 ティーエスワン投与量:BSA<1.25m2:80mg/日, 1.25m2≤BSA<1.50m2:100mg/日, BSA≥1.50m2:120mg/日. ドセタキセル:調製後4時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	...	15	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○								
3	生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」	1 B 40 mg/m2	側管	1時間	○								
4	ティーエスワン配合OD錠 1日目の夕~15日目の朝まで	80 mg/m2/日	内服	1日2回朝食後	△	○	○	○	△				