

【がん種】 [肝癌](#)
 【レジメン名】 EPI
 【登録番号】 060904
 【1コースの期間】 4週間
 【総コース数】 進行・再発:PDまで(エビルピシン生涯投与量900mg/m2まで)
 【催吐性リスク】 中等度:エビルピシン
 【抗がん剤の組織障害性】 起壊死性(ピンカント):エビルピシン
 【投与量に制限のある薬剤】 エビルピシン:生涯に900mg/m2まで
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 癌と化学療法 25:1713-1719, 1998. Cnacer Chemother Pharmacol 33 :S149-S152, 1994.

【点滴の時間】 [day1~]25時間
 【費用】 編集中
 【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日			
					1	2	...	28
1	フィジオ140輸液 500mL	1 B	メイン	6時間 PM12:00~	○			
	ファモチジン注射用 20mg	1 V						
2	ソセゴン注射液 15mg	1 A	筋注		○			
	アタラックス-P 注射液 25mg	1 A						
3	グラニセトロン点滴静注液/バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分	○			
4	注射用水 20mL	2 A	動注	1mL/分 90mgあたり20mLで溶解	○			
	エビルピシン塩酸塩注射用「NK」	60 mg/m2						
5	ビーフリード輸液 500mL	1 B	メイン	6時間	○			
6	フィジオ140輸液 500mL	1 B	メイン	6時間		○		
	ファモチジン注射用 20mg	1 V						
7	ビーフリード輸液 500mL	1 B	メイン	6時間		○		