

**【がん種】** [肝癌](#)  
**【レジメン名】** EPI+Lipiodol  
**【登録番号】** 060902  
**【1コースの期間】** 4週間  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで(エビルピシン生涯投与量900mg/m2まで)  
**【催吐性リスク】** 中等度:エビルピシン  
**【抗がん剤の組織障害性】** 起壊死性(ピンカント):エビルピシン  
**【投与量に制限のある薬剤】** エビルピシン:生涯に900mg/m2まで  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Cnacer Chemother Pharmacol 33 :S149-S152, 1994. Jpn J Radiol 28:362-368, 2010.

**【点滴の時間】** [day1~]25時間  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日			
					1	2	...	28
1	フィジオ140輸液 500mL	1 B	メイン	6時間 PM12:00~	○			
	ファモチジン注射用 20mg	1 V						
2	ソセゴン注射液 15mg	1 A	筋注		○			
	アタラックス-P 注射液 25mg	1 A						
3	グラニセトロン点滴静注液/バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分	○			
4	リピオドール480注 10mL	2 A	動注	1mL/分 10mgあたり1mLで溶解	○			
	エビルピシン塩酸塩注射液「NK」	60 mg/m2						
5	ビーフリード輸液 500mL	1 B	メイン	6時間	○			
6	フィジオ140輸液 500mL	1 B	メイン	6時間		○		
	ファモチジン注射用 20mg	1 V						
7	ビーフリード輸液 500mL	1 B	メイン	6時間		○		