

【がん種】 [子宮頸癌](#)
 【レジメン名】 CDDP+NGT
 【登録番号】 252103
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:6コースまで
 【催吐性リスク】 高度:シスプラチン、軽度:ハイカムチン
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ハイカムチン、シスプラチン
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 23:4626-4633, 2005. J Clin Oncol 27:4649-4655, 2009.

【点滴の時間】 [day1~]73時間
 【費用】 編集中
 【その他】 ハイカムチン:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要である。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	4	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○							
2	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:00~	○							
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○							
4	生理食塩液 250mL プロイメド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○							
5	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○							
6	生理食塩液 100mL ハイカムチン注射用	1 B 0.75 mg/m2	側管	30分	○							
7	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○							
8	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分	○							
9	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 50 mg/m2	側管	90分 遮光	○							
10	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分	○							
11	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間 残破棄	○							
12	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間 AM0:00~		○	○	○				
13	ソルデム3A 200mL	1 B	メイン	3時間		○	○					
14	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ		○	○					
15	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分		○						
16	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分			○					
17	生理食塩液 100mL ハイカムチン注射用	1 B 0.75 mg/m2	側管	30分		○	○					
18	ソルデム3A 200mL	1 B	メイン	4時間		○	○					
19	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○					
20	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分 AM6:00~				○				