【がん種】 子宮頸癌
【レジメン名】 CDDP+PTX
【登録番号】 252104
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発：6コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、軽度：パクリタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント（起壊死性）：パクリタキセル、イリタント（炎症性）：シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 22:3113-3119, 2004. J Clin Oncol 27:4649-4655, 2009. N Engl J Med 370:734-743, 2014. Lancet Oncol 16:301-311, 2015. J Clin Oncol 33:2129-2135, 2015.

【点滴の時間】 [day1～]94時間
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：アルコール不耐性ではない.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	4	5	…	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○	○					
2	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 パクリタキセル投与30分前	○						
3	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注射用 20mg	1 B 3 V 1 A	側管	全開 開始時にレスタミン内服	○						
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○						
5	生理食塩液 250mL パクリタキセル注「NK」	1 B 67.5 mg/m2	側管	12時間 フィルター使用（DEHPフリー）	○						
6	生理食塩液 250mL パクリタキセル注「NK」	1 B 67.5 mg/m2	側管	12時間 フィルター使用（DEHPフリー）	○						
7	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 6のパクリタキセルと一緒に投与	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:30～		○					
8	ソルデム1 500mL 6のパクリタキセルと一緒に投与	1 B	側管	90分		○					
9	生理食塩液 250mL プロイメンド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分		○					
10	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分		○					
11	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分		○					
12	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分		○					
13	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 50 mg/m2	側管	90分 遮光		○					
14	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分		○					
15	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間　残破棄		○					
16	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間 AM0:00～			○	○	○		
17	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分 AM6:00～			○				
18	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分 AM6:00～				○	○		
19	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間			○	○			
20	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間			○	○			