【がん種】 小細胞肺癌
【レジメン名】 CDDP+VP-16+RT ショートハイドレーション
【登録番号】 100315
【1コースの期間】 16週間
【投与間隔調整規定】 day29, 57, 85:-2日
【総コース数】 根治的:1コースまで
【催吐性リスク】 高度:シスプラチン、軽度:ラステット
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ラステット(漏出時の冷却禁止), シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、クレアチニン増加、アレルギー反応、疲労、聴力障害、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚不全、下痢、便秘、脱毛

【必要な検査】 一般採血
【根拠論文】 N Engl J Med 340:265-271, 1999. J Clin Oncol 17:2681-2691, 1999. J Clin Oncol 20:3054-3060, 2002.
Jpn J Clin Oncol 2013;43:1105-09. Jpn J Clin Oncol 2013;43:1115-23. シスプラチン投与におけるショートハイドレーション法の手引き:2015年.
【点滴の時間】 [day1, 29, 57, 85]8時間15分、[day2, 30, 58, 86]3時間、[day3, 31, 59, 87]3時間
【その他】 対象患者:Ccr60mL/min以上, 飲水指示に対して十分な理解力がある, 心機能が保たれている(1時間あたり500mLの補液に耐えうる), ECOG PS 0～1. 飲水は少量ずつ行う, アルコール不耐性でない患者.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日																																					
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	…	29	30	31	32	…	57	58	59	60	…	85	86	87	88	…	112
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○																				○					○					○					
2	飲水	約1 L	経口	シスプラチン投与終了までに	○																				○					○					○					
3	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	1時間 AM9:00～	○																				○					○					○					
4	ソルデム1 500mL	1 B	側管	1時間	○																				○					○					○					
5	生理食塩液 250mL プロイメンド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○																				○					○					○					
6	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○																				○					○					○					
7	5%ブドウ糖液 500mL ラステット注 調製後3時間以内に投与を終了する	1 B 100 mg/m2	側管	90分	○																				○					○					○					
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○																				○					○					○					
9	20%マンニットール注射液 300mL	0.5 V	側管	30分	○																				○					○					○					
10	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 80 mg/m2	側管	1時間 遮光	○																				○					○					○					
11	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	1時間	○																				○					○					○					
12	飲水	最低1 L	経口	1日かけて飲水		○	○																			○	○				○	○				○	○			
13	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ		○	○																			○	○				○	○				○	○			
14	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分		○																				○					○					○				
15	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分			○																				○					○					○			
16	5%ブドウ糖液 500mL ラステット注 調製後3時間以内に投与を終了する	1 B 100 mg/m2	側管	90分		○	○																			○	○				○	○				○	○			
17	デカドロン錠 4mg	2 錠/回	内服	1日2回朝昼食後				○																				○					○					○		
18	放射線	1.5 Gy/回		1日2回4時間以上間をあけて		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○																	

【CDDP+VP-16+RT ショートハイドレーション減量・休薬・中止基準】
なし