

**【がん種】** [食道癌](#)  
**【レジメン名】** DCF  
**【登録番号】** 100414  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【投与間隔調整規定】** -1日  
**【総コース数】** 術前:3コース  
**【催吐性リスク】** 高度:シスプラチン、軽度:ドセタキセル、5-FU  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(壊死性):ドセタキセル、イリタント(炎症性):シスプラチン、5-FU  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、クレアチニン増加、疲労、聴力障害、浮腫、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚不全、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、脱毛、湿疹、爪変色、爪線状隆起、爪脱落  
**【必要な検査】** 一般採血  
**【根拠論文】** Ann Oncol 28:116-120, 2017. Jpn J Clin Oncol 43:752-755, 2013. Cancer Sci 104: 1455-1460, 2013.  
**【点滴の時間】** [day1~]128時間  
**【その他】** -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					1	2	3	4	5	...	21			
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○									
2	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:00~	○									
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○									
4	生理食塩液 250mL ホスアプレピタント点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○									
5	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○									
6	生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」	1 B 70 mg/m2	側管	1時間	○									
7	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○									
8	生理食塩液 100mL ランックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分	○									
9	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 70 mg/m2	側管	90分 遮光	○									
10	生理食塩液 500mL 5-FU注 11のソルデム3Aと同時に開始	1 B 750 mg/m2	側管	24時間	○									
11	ソルデム3A 500mL 10の5-FUと同時に開始	1 B	側管	90分	○									
12	ラクテック注 500mL	1 B	側管	9時間 残破棄	○									
13	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	12時間 AM0:00~		○	○							
14	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分 AM6:00~		○								
15	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分 AM6:00~			○	○						
16	ラクテック注 500mL	1 B	側管	12時間		○	○							
17	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ		○	○	○	○					
18	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 750 mg/m2	側管	24時間		○	○	○	○					