

【がん種】 **食道癌**
【レジメン名】 FP+Nivolumab
【登録番号】 100416
【1コースの期間】 4週間
【投与間隔調整規定】 -1日
【総コース数】 進行・再発:2年間まで
【催吐性リスク】 高度:シスプラチン、軽度:5-FU、最小度:オプジーボ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):シスプラチン、5-FU、ノンビシカント(非壊死性):オプジーボ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、クレアチニン増加、AST増加、ALT増加、下垂体機能低下症、副腎機能不全、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、高血糖、注入に伴う反応、サイトカイン放出症候群、アレルギー反応、疲労、聴力障害、間質性肺炎、心筋炎、血栓塞栓症、消化管穿孔、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎症、味覚不全、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、脱毛、湿疹
【必要な検査】 一般採血、TSH、遊離T3、遊離T4、血糖、コルチゾール、ACTH、必要に応じて間質性肺炎の確認
【根拠論文】 N Engl J Med 2022;386:449-462.
【点滴の時間】 [day1~]127時間40分
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					1	2	3	4	5	...	28			
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○									
2	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:00~	○									
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○									
4	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○									
5	生理食塩液 100mL オプジーボ点滴静注	1 B 480 mg	側管	30分 フィルター使用 シリコン製ポート使用禁止	○ ○									
6	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○									
7	生理食塩液 250mL ホスアプレピタント点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○									
8	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○									
9	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○									
10	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分	○									
11	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 80 mg/m2	側管	90分 遮光	○									
12	生理食塩液 500mL 5-FU注 13のソルデム3Aと同時に開始	1 B 800 mg/m2	側管	24時間	○									
13	ソルデム3A 500mL 12の5-FUと同時に開始	1 B	側管	90分	○									
14	ラクテック注 500mL	1 B	側管	9時間 残破棄	○									
15	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	12時間 AM0:00~		○	○							
16	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分 AM6:00~		○								
17	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分 AM6:00~			○	○						
18	ラクテック注 500mL	1 B	側管	12時間	○	○								
19	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○	○						
20	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 800 mg/m2	側管	24時間	○	○	○	○						