

【がん種】 [食道癌](#)
 【レジメン名】 FP②術前・術後
 【登録番号】 100404
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 術前・術後補助:2コースまで
 【催吐性リスク】 高度:シスプラチン、軽度:5-FU
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):シスプラチン, 5-FU
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 21:4592-4596, 2003. Ann Surg Oncol 19:68-74, 2012.

【点滴の時間】 [day1~]127時間
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者:[術前]Stage II~III, [術後補助]リンパ節転移+のStage II~III.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					1	2	3	4	5	...	21			
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○									
2	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:00~	○									
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○									
4	生理食塩液 250mL フロイメド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○									
5	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○									
6	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○									
7	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分	○									
8	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 80 mg/m2	側管	90分 遮光	○									
9	生理食塩液 500mL 5-FU注 10のソルデム3Aと同時に開始	1 B 800 mg/m2	側管	24時間	○									
10	ソルデム3A 500mL 9の5-FUと同時に開始	1 B	側管	90分	○									
11	ラクテック注 500mL	1 B	側管	9時間 残破棄	○									
12	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	12時間 AM0:00~		○	○							
13	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分 AM6:00~		○								
14	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分 AM6:00~			○	○						
15	ラクテック注 500mL	1 B	側管	12時間		○	○							
16	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ		○	○	○	○					
17	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 800 mg/m2	側管	24時間		○	○	○	○					