

【がん種】 [精巣腫瘍](#)
【レジメン名】 EP
【登録番号】 201703
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 術後補助:4コースまで、進行・再発:4コースまで
【催吐性リスク】 高度:シスプラチン、軽度:ラステット
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ラステット(漏出時の冷却禁止)、シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Ann Oncol 18:917-924, 2007.

【点滴の時間】 [day1~]104時間
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:胚細胞腫瘍,アルコール不耐性でない患者. ラステット:調製後3時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	4	5	...	21	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○	○	○			
2	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM9:30~	○	○	○	○	○			
3	生理食塩液 250mL プロイメント点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○							
4	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○							
5	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分		○						
6	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分			○	○	○			
7	5%ブドウ糖液 500mL ラステット注	1 B 100 mg/m2	側管	90分	○	○	○	○	○			
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○	○	○	○	○			
9	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分	○	○	○	○	○			
10	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 20 mg/m2	側管	90分 遮光	○	○	○	○	○			
11	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分	○	○	○	○	○			
12	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	24時間 残破棄	○	○	○	○				