【がん種】 精巣腫瘍
【レジメン名】 VIP
【登録番号】 201702
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発：4コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、中等度：イホマイド、軽度：ラステット
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：イホマイド, ラステット（漏出時の冷却禁止）, シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 16:1287-1293, 1998. Cancer 66:2476-2481,1990. Cancer 97 1869-1875, 2003.

【点滴の時間】 [day1～]121時間
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：胚細胞腫瘍, アルコール不耐性でない患者. ラステット：調製後3時間以内に投与を終了する. イホマイド：調製後6時間以内に投与を終了する.

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 21 |
| 1 | 生理食塩液 250mL | 1 B | メイン | キープ＆フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 2 | ソルデム3A 500mL | 1 B | 側管 | 90分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL | 0.4 A | | AM8:00～ | | | | | | | | |
| 3 | ソルデム1 500mL | 1 B | 側管 | 90分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 4 | 生理食塩液 250mL | 1 B | 側管 | 30分 | ○ | | | | | | | |
| | プロイメンド点滴静注用 150mg | 1 V | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 30分 | ○ | | | | | | | |
| | アロキシ静注 0.75mg | 1 V | | | | | | | | | | |
| | デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL | 2 A | | | | | | | | | | |
| | デカドロン注射液 6.6mg/2mL | 1 V | | | | | | | | | | |
| 6 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 30分 | | ○ | | | | | | |
| | デカドロン注射液 6.6mg/2mL | 1 V | | | | | | | | | | |
| 7 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 30分 | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | デカドロン注射液 6.6mg/2mL | 2 V | | | | | | | | | | |
| 8 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | ウロミテキサン注100mg | 400 mg/m2 | | イホマイド投与量の1/3 | | | | | | | | |
| | 9のイホマイドと同時に開始 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 生理食塩液 500mL | 1 B | 側管 | 2時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 注射用イホマイド | 1200 mg/m2 | | | | | | | | | | |
| | 8のウロミテキサンと同時に開始 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 11 | 生理食塩液 50mL | 1 V | 側管 | 15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | ダイアモックス注射用 500mg | 1 A | | | | | | | | | | |
| 12 | 生理食塩液 50mL | 1 B | 側管 | 全開 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 13 | 生理食塩液 250mL | 1 B | 側管 | 90分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | シスプラチン点滴静注「マルコ」 | 20 mg/m2 | | 遮光 | | | | | | | | |
| 14 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | ウロミテキサン注100mg | 400 mg/m2 | | イホマイド投与量の1/3 | | | | | | | | |
| | イホマイド開始から約4時間後 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5%ブドウ糖液 500mL | 1 B | 側管 | 90分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | ラステット注 | 75 mg/m2 | | | | | | | | | | |
| 16 | ソルデム3A 500mL | 1 B | メイン | 24時間　残破棄 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 17 | ソルデム3A 500mL | 1 B | メイン | 24時間 | | | | | ○ | | | |
| | | | | 翌日AM8:00で終了 | | | | | | | | |
| 18 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | ウロミテキサン注100mg | 400 mg/m2 | | イホマイド投与量の1/3 | | | | | | | | |
| | イホマイド開始から約8時間後 | | | | | | | | | | | |