

**【がん種】** [前立腺癌](#)  
**【レジメン名】** Abiraterone+PSL②去勢抵抗性  
**【登録番号】** 201812  
**【1コースの期間】** 連日  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 分類なし:ザイティガ  
**【抗がん剤の組織障害性】** -  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** N Engl J Med 364:1995-2005, 2011. Lancet Oncol 13:983-992, 2012. Lancet Oncol 13:1210-1217, 2012. Ann Oncol 24:1017-1025, 2013. European Journal of Cancer 49:3648-3657, 2013. Lancet Oncol 14:1193-1199, 2013. Lancet Oncol 15:1263-1268, 2014. Lancet Oncol 16:152-160, 2015. EUROPEAN UROLOGY 66:815-825, 2014.

**【点滴の時間】** -  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 原則, 外科的あるいは内科的去勢術と併用する.

| Rp | 薬剤名                          | 量         | 投与方法 | 投与時間    | 投与日 |   |
|----|------------------------------|-----------|------|---------|-----|---|
|    |                              |           |      |         | 連日  |   |
| 1  | ザイティガ錠<br>食事の1時間前から食後2時間を避ける | 1000 mg/回 | 内服   | 1日1回    | ○   | ○ |
| 2  | プレドニン錠 5mg                   | 2 錠/回     | 内服   | 1日1回朝食後 | ○   | ○ |