

【がん種】 [前立腺癌](#)
【レジメン名】 Cabazitaxel+PSL
【登録番号】 201814
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:10コースまで
【催吐性リスク】 軽度:ジェブタナ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ジェブタナ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet 376:1147-1154, 2010. J Clin Oncol 31:3944-3950, 2013. Ann Oncol 24:2402-2408, 2013.

【点滴の時間】 [day1]2時間35分

【費用】 編集中

【その他】 ジェブタナ:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要。

原則, 外科的あるいは内科的去勢術と併用する。ジェブタナ:調製後8時間以内に投与を終了する。ジールスタ:抗がん剤投与終了後24~72時間の間に投与する。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	21
1	プレドニン錠 5mg	2 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○
2	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	全開	○				
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V							
	ポラミン注 5mg/1mL	1 A							
	ファモチジン注射用 20mg	1 A							
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○				
5	生理食塩液 250mL	1 B	側管	1時間	○				
	ジェブタナ点滴静注	25 mg/m2		フィルター使用					
6	ジールスタ皮下注3.6mg	1 本	皮下注			○			