

【がん種】 [前立腺癌](#)
【レジメン名】 DTX ホルモン感受性+例
【登録番号】 201815
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:6コースまで
【催吐性リスク】 軽度:ドセタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ドセタキセル
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 14:149-158, 2013. N Engl J Med 373:737-746, 2015.

【点滴の時間】 [day1]2時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:ホルモン感受性+. 必ずADTと併用する. ドセタキセル:調製後4時間以内に投与を終了する. 最大75mg/m2で投与可能.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V					
3	生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」	1 B 70 mg/m2	側管	1時間	○		