

【がん種】 [前立腺癌](#)
 【レジメン名】 DTX+PSL CRPC例
 【登録番号】 201801
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:10コースまで
 【催吐性リスク】 軽度:ドセタキセル
 【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ドセタキセル
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 N Engl J Med 351:1502-1512, 2004. J Clin Oncol 26:242-245, 2008. Jpn J Clin Oncol 38:365-372, 2008.

【点滴の時間】 [day1]2時間30分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者:CRPC例. 原則, 外科的あるいは内科的去勢術と併用する. ドセタキセル:調製後4時間以内に投与を終了する. 最大75mg/m²で投与可能.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	プレドニン錠 5mg	2 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○
2	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V					
4	生理食塩液 250mL	1 B	側管	1時間	○		
	ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」	70 mg/m ²					