

【がん種】 [多発性骨髄腫](#)  
 【レジメン名】 DBd③9コース目～  
 【登録番号】 011326  
 【1コースの期間】 3週間  
 【総コース数】 PDまで (DBd②4～8コース目 終了後から)  
 【催吐性リスク】 軽度:ダラザレックス  
 【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):ダラザレックス  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 N Engl J Med 375:1319-1331, 2016.

【点滴の時間】 [day1]初回 約8時間50分, 2回目 約6時間20分, 3回目～約5時間30分  
 【費用】 編集中  
 【その他】 ダラザレックス:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要. 調製後15時間以内に投与を終了する.  
 治療開始前に間接クームス試験を実施する(最終投与から6ヵ月後までは、検査結果が偽陽性になるおそれがあるため).

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	アセトアミノフェン錠 200mg	4 錠/回	内服	1日1回 ダラザレックス投与1時間前	○		
3	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 3 V 1 A	側管	全開 開始時にアセトアミノフェン内服	○		
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間	○		
5	生理食塩液 1000mL ダラザレックス点滴静注	1 B 16 mg/kg	側管	フィルター使用 全量1000mLに調製	○		初回
6	生理食塩液 500mL ダラザレックス点滴静注	1 B 16 mg/kg	側管	フィルター使用 全量500mLに調製	○		2回目～