

【がん種】 **多発性骨髄腫**
【レジメン名】 DLd既治療①1～2コース目
【登録番号】 011327
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 2コースまで(忍容性があればDLd既治療②3～6コース目を施行する)
【催吐性リスク】 軽度:レブラミド, ダラザレックス
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):ダラザレックス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 375:1319-1331, 2016.
【点滴の時間】 [day1]1コース目約8時間35分, 2コース目～約5時間15分, [day8]1コース目約6時間5分, 2コース目～約5時間15分, [day15, 22]約5時間15分
【費用】 編集中
【その他】 ダラザレックス: 正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要。調製後15時間以内に投与を終了する。
治療開始前に間接クーモス試験を実施する(最終投与から6ヵ月後までは、検査結果が偽陽性になるおそれがあるため)。
レブラミド:レブレイトでの運用, 必ず院内処方, VTEのリスクに応じてバイアスピリン錠 1錠/日 or ワルファリンカリウム錠 (PT-INR 2～3を目標)を服用する(Leukemia 22, 414-423, 2008.)

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日																													
					1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	...	28																
1	レブラミドカプセル ダラザレックス投与日は、朝食後に服用できない場合ダラザレックス開始前に服用	25 mg/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○			○			○												○											
3	アセトアミノフェン錠 200mg	4 錠/回	内服	1日1回 ダラザレックス投与1時間前	○			○			○												○											
4	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポラミン注 5mg/1mL	1 B 3 V 1 A	側管	全開 開始時にアセトアミノフェン内服	○			○			○												○											
5	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間	○			○			○												○											
6	生理食塩液 1000mL ダラザレックス点滴静注 初回 50mL/hで開始し、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで	1 B 16 mg/kg	側管	フィルター使用 全量1000mLに調製 1コース目	○																													
7	生理食塩液 500mL ダラザレックス点滴静注 2回目 50mL/hで開始し、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで 3回目～ 100mL/hで開始し、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで	1 B 16 mg/kg	側管	フィルター使用 全量500mLに調製 2コース目	○			○			○												○											
8	レナデックス錠 4mg	5 錠	内服	1日1回朝食後		○			○			○																	○					