【がん種】 多発性骨髄腫
【レジメン名】 BD②維持
【登録番号】 011304
【1コースの期間】 5週間
【総コース数】 PDまで(BD①寛解導入終了後から)
【催吐性リスク】 最小度:ベルケイド
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ベルケイド
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 British Journal of Haematology 127:165-172, 2004. Haematologica 91:929-934, 2006. N Engl J Med 352:2487-2498, 2005. Blood 110:3557-3560, 2007.

【点滴の時間】 -
【費用】 編集中
【その他】 ベルケイド:調製後8時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	2	…	8	9	…	15	16	…	22	23	…	35
1	アシクロビル錠 200mg	2 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	生理食塩液 20mL	1 A	皮下注	2.5mg/mLの濃度に調製	○			○			○			○			
	ベルケイド注射用	1.3 mg/m2		27Gの針 腹部、大腿部													
3	レナデックス錠 4mg	5 錠	内服	1日1回朝食後	○	○		○	○		○	○		○	○		
	朝食後に服用できない場合には可能な限り早い時間に服用																