【がん種】 多発性骨髄腫
【レジメン名】 BLd
【登録番号】 011323
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 移植なし：8コースまで（終了後にPDでなければLdを施行する）、移植前：3コースまで
【催吐性リスク】 軽度：レブラミド、最小度：ベルケイド
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：ベルケイド
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet 389:519-527, 2017.  N Engl J Med 376:1311-1320, 2017.

【点滴の時間】 –
【費用】 編集中
【その他】 ベルケイド：調製後8時間以内に投与を終了する.
レブラミド：レブメイトでの運用，必ず院内処方，VTEのリスクに応じてバイアスピリン錠 1錠/日 or ワルファリンカリウム錠（PT-INR 2～3を目標）を服用する（Leukemia 22, 414-423, 2008.）.

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | … | 4 | 5 | … | 8 | 9 | … | 11 | 12 | … | 14 | … | 21 |
| 1 | アシクロビル錠 200mg | 2 錠/回 | 内服 | 1日1回朝食後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 生理食塩液 20mL<br>ベルケイド注射用<br>調製開始から8時間以内に投与終了 | 1 A<br>1.3 mg/m2 | 皮下注 | 2.5mg/mLの濃度に調製<br>27Gの針 腹部、大腿部 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 3 | レナデックス錠 4mg<br>朝食後に服用できない場合には可能な限り早い時間に服用 | 5 錠 | 内服 | 1日1回朝食後 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| 4 | レブラミドカプセル<br>高脂肪食後の投与を避ける | 25 mg/回 | 内服 | 1日1回夕食後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |