【がん種】 多発性骨髄腫
【レジメン名】 MPB①1～4コース目
【登録番号】 011308
【1コースの期間】 6週間
【総コース数】 4コースまで(SD以上の効果が得られた場合にはMPB②5～9コース目 を施行する)
【催吐性リスク】 軽度:MPB
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ベルケイド
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 359:906-917, 2008. J Clin Oncol 28:2259-2266, 2010.

【点滴の時間】 -
【費用】 編集中
【その他】 ベルケイド:調製後8時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	2	3	4	…	8	…	11	…	22	…	25	…	29	…	32	…	42
1	アルケラン錠	9 mg/m2	内服	1日1回朝食前	○	○	○	○														
2	プレドニン錠 5mg	60 mg/m2	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○														
	朝食後に服用できない場合には可能な限り早い時間に服用																					
3	アシクロビル錠 200mg	2 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	生理食塩液 20mL	1 A	皮下注	2.5mg/mLの濃度に調製	○			○		○		○		○		○		○		○		
	ベルケイド注射用	1.3 mg/m2		27Gの針 腹部、大腿部																		