

【がん種】 [多発性骨髄腫](#)
 【レジメン名】 MPB②5～9コース目
 【登録番号】 011320
 【1コースの期間】 6週間
 【総コース数】 5コースまで(MPB①1～4コース目 終了後から)
 【催吐性リスク】 軽度:MPB
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ベルケイド
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 N Engl J Med 359:906-917, 2008. J Clin Oncol 28:2259-2266, 2010.

【点滴の時間】 -
 【費用】 編集中
 【その他】 ベルケイド:調製後8時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	2	3	4	...	8	...	22	...	29	...	42			
1	アルケラン錠	9 mg/m ²	内服	1日1回朝食前	○	○	○	○											
2	プレドニン錠 5mg 朝食後に服用できない場合には可能な限り早い時間に服用	60 mg/m ²	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○											
3	アシクロビル錠 200mg	2 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	生理食塩液 20mL ベルケイド注射用	1 A 1.3 mg/m ²	皮下注	2.5mg/mLの濃度に調製 27Gの針 腹部、大腿部	○					○	○			○					