【がん種】 多発性骨髄腫
【レジメン名】 MPB③1週毎Bortezomib
【登録番号】 011321
【1コースの期間】 5週間
【総コース数】 9コースまで
【催吐性リスク】 軽度：MPB
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：ベルケイド
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 28:5101-5109, 2010. Blood 116:4745-4753, 2010. J Clin Oncol 32:634-640, 2014.

【点滴の時間】 –
【費用】 編集中
【その他】 ベルケイド：調製後8時間以内に投与を終了する.

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 8 | … | 15 | … | 22 | … | 35 |
| 1 | アルケラン錠 | 9 mg/m2 | 内服 | 1日1回朝食前 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 2 | プレドニン錠 5mg | 60 mg/m2 | 内服 | 1日1回朝食後 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 朝食後に服用できない場合には可能な限り早い時間に服用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | アシクロビル錠 200mg | 2 錠/回 | 内服 | 1日1回朝食後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 生理食塩液 20mL | 1 A | 皮下注 | 2.5mg/mLの濃度に調製 | ○ | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| | ベルケイド注射用 | 1.3 mg/m2 | | 27Gの針 腹部、大腿部 | | | | | | | | | | | | |