【がん種】 多発性骨髄腫
【レジメン名】 Panobinostat+BD①1～8コース目
【登録番号】 011318
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 8コースまで（SD以上の効果が得られた場合にはPanobinostat+BD②9～16コース目 を施行する）
【催吐性リスク】 中等度～高度：ファリーダック、最小度：ベルケイド
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：ベルケイド
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 15:1195-1206, 2014.

【点滴の時間】 –
【費用】 編集中
【その他】 ファリーダック：正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要.
ベルケイド：調製後8時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	21
1	アシクロビル錠 200mg	400 mg/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	生理食塩液 20mL ベルケイド注射用	1 A 1.3 mg/m2	皮下注	2.5mg/mLの濃度に調製 27Gの針 腹部、大腿部	○			○			○			○			
3	レナデックス錠 4mg 朝食後に服用できない場合には可能な限り早い時間に服用	5 錠	内服	1日1回朝食後	○	○		○	○		○	○		○	○		
4	ファリーダックカプセル	20 mg/回	内服	1日1回夕食後	○		○		○		○		○		○		