【がん種】 多発性骨髄腫
【レジメン名】 Panobinostat+BD②9～16コース目
【登録番号】 011319
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 8コースまで(Panobinostat+BD①1～8コース目 終了後から)
【催吐性リスク】 中等度～高度:ファリーダック、最小度:ベルケイド
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ベルケイド
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 15:1195-1206, 2014.

【点滴の時間】 –
【費用】 編集中
【その他】 ファリーダック:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要.
ベルケイド:調製後8時間以内に投与を終了する.

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | 21 |
| 1 | アシクロビル錠 200mg | 400 mg/回 | 内服 | 1日1回朝食後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 生理食塩液 20mL<br>ベルケイド注射用 | 1 A<br>1.3 mg/m2 | 皮下注 | 2.5mg/mLの濃度に調製<br>27Gの針 腹部、大腿部 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| 3 | レナデックス錠 4mg<br>朝食後に服用できない場合には可能な限り早い時間に服用 | 5 錠 | 内服 | 1日1回朝食後 | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| 4 | ファリーダックカプセル | 20 mg/回 | 内服 | 1日1回夕食後 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |