【がん種】 多発性骨髄腫
【レジメン名】 VAD①急速投与
【登録番号】 011302
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 PDまで(アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで)
【催吐性リスク】 中等度:アドリアシン、最小度:オンコビン
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):オンコビン(漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止), アドリアシン
【投与量に制限のある薬剤】 オンコビン:1回に2mg/bodyまで、アドリアシン:生涯に500mg/m2まで
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 British Journal of Haematology 105:127-130, 1999.

【点滴の時間】 [day1, 2, 3, 4]2時間
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日															
					1	2	3	4	…	9	10	11	12	…	17	18	19	20	…	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○	○	○	○												
2	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 5 V	側管	30分	○															
3	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 5 V	側管	30分		○	○	○												
4	生理食塩液 100mL オンコビン注射用 アドリアシン注用	1 B 0.4 mg 9 mg/m2	側管	30分	○	○	○	○												
5	レナデックス錠 4mg	10 錠/回	内服	1日1回朝食後						○	○	○	○		○	○	○	○		