【がん種】 多発性骨髄腫
【レジメン名】 Carfilzomib+DEX①1コース目
【登録番号】 011311
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 1コースまで（忍容性があればCarfilzomib+DEX②2コース目～ を施行する）
【催吐性リスク】 軽度：カイプロリス
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：カイプロリス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 17:27-38, 2016.

【点滴の時間】 [day1～, 8～, 15～]49時間
【費用】 編集中
【その他】 カイプロリス：正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要. 体表面積が2.2m2を超える場合は体表面積2.2m2として投与量を算出する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	2	…	8	9	…	15	16	…	22	23	…	28
1	アシクロビル錠 200mg	2 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○	○		○	○		○	○					
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	12時間　残破棄	○	○		○	○		○	○					
4	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 3 V	側管	全開	○	○		○	○		○	○					
5	5%ブドウ糖液 100mL	1 B	側管	30分	○	○		○	○		○	○					
6	5%ブドウ糖液 100mL カイプロリス点滴静注用 day1, 2は20mg/m2、day8～56mg/m2 蒸留水 100mL	1 B - mg/m2 1 B	側管	30分 カイプロリス溶解用	○	○		○	○		○	○					
7	5%ブドウ糖液 100mL	1 B	側管	全開	○	○		○	○		○	○					
8	ソルデム1 500mL	1 B	側管	12時間　残破棄	○	○		○	○		○	○					
9	レナデックス錠 4mg	5 錠/回	内服	1日1回朝食後										○	○		