

【がん種】 [多発性骨髄腫](#)
【レジメン名】 Carfilzomib+DEX②2コース目～
【登録番号】 011312
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 PDまで (Carfilzomib+DEX①1コース目 終了後から)
【催吐性リスク】 軽度:カイプロリス
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):カイプロリス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 17:27-38, 2016.

【点滴の時間】 [day1, 2, 8, 9, 15, 16]2時間5分

【費用】 編集中

【その他】 カイプロリス:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要. 体表面積が2.2m2を超える場合は体表面積2.2m2として投与量を算出する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28		
1	アシクロビル錠 200mg	2 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○		○	○			○	○						
3	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 3 V	側管	全開	○	○		○	○			○	○						
4	5%ブドウ糖液 100mL	1 B	側管	30分	○	○		○	○			○	○						
5	5%ブドウ糖液 100mL カイプロリス点滴静注用 蒸留水 100mL	1 B 56 mg/m2 1 B	側管	30分 カイプロリス溶解用	○	○		○	○			○	○						
6	レナデックス錠 4mg	5 錠/回	内服	1日1回朝食後													○	○	