

**【がん種】** [大腸癌](#)  
**【レジメン名】** TAS-102+Bmab  
**【登録番号】** 160555  
**【1コースの期間】** 4週間  
**【投与間隔調整規定】** なし  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 中等度:ロンサーフ、最小度:ペバシズマブ  
**【抗がん剤の組織障害性】** ノンビシカント(非壊死性):ペバシズマブ  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注入に伴う反応、疲労、間質性肺炎、高血圧、蛋白尿、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎症、味覚異常、下痢、便秘

**【必要な検査】** 一般採血、血圧、尿蛋白定性、尿蛋白/Cre比  
**【根拠論文】** Lancet Oncol 21: 412-420, 2020.

**【点滴の時間】** [day1]初回2時間30分, 2回目2時間, 3回目~90分  
**【その他】** ロンサーフ: ロンサーフ投与量: BSA<1.07m<sup>2</sup>: 70mg/日, 1.07m<sup>2</sup>≤BSA<1.23m<sup>2</sup>: 80mg/日, 1.23m<sup>2</sup>≤BSA<1.38m<sup>2</sup>: 90mg/日, 1.38m<sup>2</sup>≤BSA<1.53m<sup>2</sup>: 100mg/日, 1.53m<sup>2</sup>≤BSA<1.69m<sup>2</sup>: 110mg/日, 1.69m<sup>2</sup>≤BSA<1.84m<sup>2</sup>: 120mg/日, 1.84m<sup>2</sup>≤BSA<1.99m<sup>2</sup>: 130mg/日, 1.99m<sup>2</sup>≤BSA<2.15m<sup>2</sup>: 140mg/日, BSA≥2.15m<sup>2</sup>: 150mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日											
					1	...	6	...	8	...	13	...	15	...	28	
1	生理食塩液 100mL ペバシズマブBS点滴静注「ファイザー」 初回90分、2回目1時間、3回目~30分	1 B 5 mg/kg	側管		○									○		
2	ロンサーフ配合錠	70 mg/m <sup>2</sup> /日	内服	1日2回朝夕食後	夕	○	朝		夕	○	朝					