

【がん種】 [大腸癌](#)  
 【レジメン名】 Capecitabine  
 【登録番号】 160522  
 【1コースの期間】 3週間  
 【総コース数】 術後補助: 8コースまで  
 【催吐性リスク】 軽度: ゼロータ  
 【抗がん剤の組織障害性】 -  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 編集中  
  
 【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 Ann Oncol 14:1735-1743, 2003. N Engl J Med 352:2696-2704, 2005.  
  
 【点滴の時間】 -  
 【費用】 編集中  
 【その他】 ゼロータ投与量: BSA < 1.33m<sup>2</sup>: 3000mg/日, 1.33m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.57m<sup>2</sup>: 3600mg/日, 1.57m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.81m<sup>2</sup>: 4200mg/日, BSA ≥ 1.81m<sup>2</sup>: 4800mg/日.

| Rp | 薬剤名   | 量                         | 投与方法 | 投与時間    | 投与日 |     |    |     |    |
|----|-------|---------------------------|------|---------|-----|-----|----|-----|----|
|    |       |                           |      |         | 1   | ... | 14 | ... | 21 |
| 1  | ゼロータ錠 | 2500 mg/m <sup>2</sup> /日 | 内服   | 1日2回朝食後 | ○   | ○   | ○  |     |    |