【がん種】 大腸癌
【レジメン名】 Capecitabine+RT
【登録番号】 160541
【1コースの期間】 11週間(※12週間)
【総コース数】 術前(直腸癌のみ):1コースまで
【催吐性リスク】 軽度:ゼローダ
【抗がん剤の組織障害性】 –
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 13:579-588, 2012. J Clin Oncol 32:1927-1934, 2014. JNCI J Natl Cancer Inst 107:djv248, 2015.

【点滴の時間】 –
【費用】 編集中
【その他】 ゼローダ投与量:BSA＜1.31m2:1800mg/日, 1.31m2≦BSA＜1.64m2:2400mg/日, BSA≧1.64m2:3000mg/日.
進行度により放射線の線量, スケジュールが異なる.

通常

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					…						…						…						…						…	
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	77
1	ゼローダ錠	1650 mg/m2/日	内服	1日2回朝夕食後	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
2	放射線	1.8 Gy/回		1日1回	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		

T3及び遠位側直腸病変以外の直腸癌患者

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					…						…						…						…						…				…	
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	36	37	38	…	84
1	ゼローダ錠	1650 mg/m2/日	内服	1日2回朝夕食後	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		
2	放射線	1.8 Gy/回		1日1回	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		

T4又は遠位側直腸癌患者

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					…						…						…						…						…				…	
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	36	37	38	…	84
1	ゼローダ錠	1650 mg/m2/日	内服	1日2回朝夕食後	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		
2	放射線	1.8 Gy/回		1日1回	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○						
3	放射線	3.6 Gy/回		1日1回																														○	○	○		