

【がん種】 [大腸癌](#)
【レジメン名】 CapeOX
【登録番号】 160518
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 術後補助:8コース、進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 中等度:エルプラット、軽度:ゼローダ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):エルプラット(漏出時の冷却禁止)
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 25:102-109, 2007. J Clin Oncol 29:1465-1471, 2011. J Clin Oncol 26:2006-2012, 2008. J Clin Oncol 26:2013-2019, 2008.

【点滴の時間】 [day1]3時間30分
【費用】 編集中
【その他】 ゼローダ投与量:BSA<1.36m2:2400mg/日, 1.36m2≤BSA<1.66m2:3000mg/日, 1.66m2≤BSA<1.96m2:3600mg/日, BSA≥1.96m2:4200mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	...	15	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○								
3	5%ブドウ糖液 500mL エルプラット点滴静注液	1 B 130 mg/m2	側管	2時間	○								
4	ゼローダ錠 1日目の夕~15日目の朝まで	2000 mg/m2/日	内服	1日2回朝夕食後	△	○	○	○	△				
5	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○	○						