【がん種】 大腸癌
【レジメン名】 FOLFIRI+Cmab
【登録番号】 160517
【1コースの期間】 2週間
【総コース数】 進行・再発：PDまで
【催吐性リスク】 中等度：カンプト、軽度：5-FU、最小度：アービタックス
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：カンプト，5-FU、ノンビシカント（非壊死性）：アービタックス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 360:1408-1417, 2009. Lancet Oncol 15:1065-1075, 2014.

【点滴の時間】 [day1～]初回51時間35分，2回目50時間35分、[day8]3時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：RAS遺伝子変異ー．原則、CVポートを増設して治療を行う．カンプト：UGT1A1に*6（*6/*6），*28（*28/*28），*6（ー/*6）+*28（ー/*28）のいずれかの多型がある場合には骨髄抑制が強く出現する．
インフューザーポンプの使用可否：CVポートを造設している，外来で治療する場合（入院導入後に外来へ移行する場合には初回入院時も使用可能，外来に移行せずに入院で治療を継続する場合には使用不可）．

インフューザーポンプ使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	…	8	…	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						
2	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 2 A 1 V 1 A	側管	30分 フィルター使用	○						
3	生理食塩液 250mL アービタックス注射液 初回400mg/m2、2回目～250mg/m2	1 B - mg/m2	側管	初回2時間、2回目～1時間 フィルター使用	○						
4	5%ブドウ糖液 250mL レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 5のカンプトと同時に開始	1 B 200 mg/m2	側管	2時間 フィルター使用	○						
5	5%ブドウ糖液 250mL カンプト点滴静注 4のレボホリナートと同時に開始	1 B 150 mg/m2	側管	90分 フィルター使用	○						
6	生理食塩液 50mL 5-FU注	1 B 400 mg/m2	側管	全開 フィルター使用	○						
7	5-FU注	2400 mg/m2	側管	46時間 インフューザーポンプ使用	○						
8	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○	○				
9	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ					○		
10	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 1 A	側管	30分 フィルター使用					○		
11	生理食塩液 250mL アービタックス注射液	1 B 250 mg/m2	側管	1時間 フィルター使用					○		
12	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間					○		

インフューザーポンプ未使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	…	8	…	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						
2	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 2 A 1 V 1 A	側管	30分 フィルター使用	○						
3	生理食塩液 250mL アービタックス注射液 初回400mg/m2、2回目～250mg/m2	1 B - mg/m2	側管	初回2時間、2回目～1時間 フィルター使用	○						
4	5%ブドウ糖液 250mL レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 5のカンプトと同時に開始	1 B 200 mg/m2	側管	2時間 フィルター使用	○						
5	5%ブドウ糖液 250mL カンプト点滴静注 4のレボホリナートと同時に開始	1 B 150 mg/m2	側管	90分 フィルター使用	○						
6	生理食塩液 50mL 5-FU注	1 B 400 mg/m2	側管	全開 フィルター使用	○						
7	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 2400 mg/m2	側管	46時間 フィルター使用	○						
8	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ		○					
9	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○	○				
10	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ					○		
11	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 1 A	側管	30分 フィルター使用					○		
12	生理食塩液 250mL アービタックス注射液	1 B 250 mg/m2	側管	1時間 フィルター使用					○		
13	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間					○		