

**【がん種】** [大腸癌](#)  
**【レジメン名】** Pmab  
**【登録番号】** 160524  
**【1コースの期間】** 2週間  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 最小度:ベクティビックス  
**【抗がん剤の組織障害性】** ノンシカント(非壊死性):ベクティビックス  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** J Clin Oncol 25:1658-1664, 2007. J Clin Oncol 26:1626-1634, 2008. Lancet Oncol 15:569-579, 2014.

**【点滴の時間】** [day1]3時間  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:RAS遺伝子変異-.ベクティビックス:調製後6時間以内に投与を終了し,1000mgを超える場合には90分で点滴静注する.

インフューザーポンプ使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL ベクティビックス点滴静注	1 B 6 mg/kg	側管	1時間 フィルター使用	○		
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間	○		