【がん種】 大腸癌
【レジメン名】 5-FU+RT
【登録番号】 160542
【1コースの期間】 11週間(※12週間)
【総コース数】 術前(直腸癌のみ):1コースまで
【催吐性リスク】 軽度:5-FU
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):5-FU
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 13:579-588, 2012. J Clin Oncol 32:1927-1934, 2014. JNCI J Natl Cancer Inst 107:djv248, 2015.

【点滴の時間】 [day1～, 8～, 15～, 22～, 29～]121時間、[day36～]73時間
【費用】 編集中
【その他】 進行度により放射線の線量, スケジュールが異なる.

通常

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					…						…						…						…						…	
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	77	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						○						○						○						○							
2	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ		○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○		
3	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 225 mg/m2	側管	24時間	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
4	放射線	1.8 Gy/回		1日1回	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		

T3及び遠位側直腸病変以外の直腸癌患者

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					…						…						…						…						…					
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	36	37	38	…	84
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						○						○						○						○						○				
2	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ		○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○		
3	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 225 mg/m2	側管	24時間	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		
4	放射線	1.8 Gy/回		1日1回	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		

T4又は遠位側直腸癌患者

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					…						…						…						…						…					
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	36	37	38	…	84
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						○						○						○						○						○				
2	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ		○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○		
3	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 225 mg/m2	側管	24時間	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		
4	放射線	1.8 Gy/回		1日1回	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○						
5	放射線	3.6 Gy/回		1日1回																														○	○	○		