

【がん種】 [胆道癌](#)
【レジメン名】 GEM+S-1
【登録番号】 160805
【1コースの期間】 3週間
【投与間隔調整規定】 -1日
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:ゲムシタピン, ティーエスワン
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ゲムシタピン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、発熱、疲労、流涙、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚不全、下痢、便秘、湿疹

【必要な検査】 一般採血, 間質性肺炎の確認
【根拠論文】 Ann Oncol 30:1950-1958, 2019.

【点滴の時間】 [day1, 8]2時間
【その他】 ティーエスワン投与量:BSA<1.25m2:60mg/日(朝40mg、夕20mg), 1.25m2≤BSA<1.50m2:80mg/日, BSA≥1.50m2:100mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	...	8	...	15	...	21	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○					
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		○					
3	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分	○		○					
4	ティエスワン配合OD錠 1日目の夕~15日目の朝まで	- mg/m2/日	内服	1日2回朝夕食後	△	○	○	○	△			