

【がん種】 [頭頸部癌](#)
【レジメン名】 DTX+Trastuzumab
【登録番号】 272023
【1コースの期間】 3週間
【投与間隔調整規定】 -2日
【総コース数】 進行・再発:8コースまで(終了後にPDでなければDTX or Trastuzumabメンテナンスを施行する)
【催吐性リスク】 軽度:ドセタキセル、最小度:ハーセプチン
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ドセタキセル、ノンビシカント(非壊死性):ハーセプチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注入に伴う反応、疲労、浮腫、間質性肺炎、心不全、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚不全、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、脱毛、湿疹、爪変色、爪線状隆起、爪脱落
【必要な検査】 一般採血、心エコー
【根拠論文】 HUON-003-01.
【点滴の時間】 [day1]初回4時間、2回目～3時間
【その他】 対象:HER2+かつ唾液腺癌.ドセタキセル:調製後4時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日	
					1	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○	
3	生理食塩液 250mL ハーセプチン注射用 注射用水 20mL 初回8mg/kg、2回目～6mg/kg	1 B - mg/kg 1 A	側管	初回90分、2回目～30分 ハーセプチン溶解用	○	
4	生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」	1 B 70 mg/m2	側管	1時間	○	