【がん種】 頭頸部癌
【レジメン名】 FP+Cmab
【登録番号】 272012
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発：6コース（終了後にPDでなければCmabメンテナンスを施行する）
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、軽度：5-FU、最小度：アービタックス
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：シスプラチン, 5-FU、ノンビシカント（非壊死性）：アービタックス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 359:1116-1127, 2008. Jpn J Clin Oncol 43:524-553, 2013.
【点滴の時間】 [day1～]初回105時間30分、2回目～104時間30分、[day8, 15]3時間30分
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					1	2	3	4	5	…	8	…	15	…	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						○		○		
2	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	90分	○										
	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	0.4 A		AM8:00～											
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○										
4	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○										
	プロイメンド点滴静注用 150mg	1 V													
5	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○										
	アロキシ静注 0.75mg	1 V													
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A													
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V													
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A													
6	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分							○		○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V													
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A													
7	生理食塩液 250mL	1 B	側管	初回2時間、2回目～1時間	○						○		○		
	アービタックス注射液	- mg/m2													
	初回400mg/m2、2回目～250mg/m2														
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間							○		○		
9	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○										
10	生理食塩液 100mL	1 V	側管	15分	○										
	ラシックス注 20mg/2mL	1 A													
11	生理食塩液 250mL	1 B	側管	2時間	○										
	シスプラチン点滴静注「マルコ」	100 mg/m2		遮光											
12	生理食塩液 500mL	1 B	側管	24時間	○										
	5-FU注	1000 mg/m2													
	13のソルデム3Aと同時に開始														
13	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	90分	○										
	12の5-FUと同時に開始														
14	ラクテック注 500mL	1 B	側管	9時間　残破棄	○										
15	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	12時間		○	○								
				AM0:00～											
16	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分		○									
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V		AM6:00～											
17	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分			○	○							
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	2 V		AM6:00～											
18	ラクテック注 500mL	1 B	側管	12時間		○	○								
19	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ		○	○	○							
20	生理食塩液 500mL	1 B	側管	24時間		○	○	○							
	5-FU注	1000 mg/m2													