【がん種】 頭頸部癌
【レジメン名】 weekly PTX
【登録番号】 272014
【1コースの期間】 7週間
【総コース数】 進行・再発：PDまで
【催吐性リスク】 軽度：パクリタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント（起壊死性）：パクリタキセル
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Cancer Chemother Pharmacol 68:769-776, 2011.

【点滴の時間】 [day1, 8, 15, 22, 29, 36]2時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：アルコール不耐性ではない.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…	49
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○		○		○		○		○		○		
2	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 パクリタキセル投与30分前	○		○		○		○		○		○		
3	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注射用 20mg	1 B 1 A 1 V 1 A	側管	全開 開始時にレスタミン内服	○		○		○		○		○		○		
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		○		○		○		○		○		
5	生理食塩液 250mL パクリタキセル注「NK」	1 B 100 mg/m2	側管	1時間 フィルター使用（DEHPフリー）	○		○		○		○		○		○		