

【がん種】 [頭頸部癌](#)
 【レジメン名】 FP+Pembrolizumab
 【登録番号】 272019
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:6コース(終了後にPDでなければPembrolizumabを施行する)
 【催吐性リスク】 高度:シスプラチン、軽度:5-FU、最小度:キイトルーダ
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):シスプラチン、5-FU、ノンビンカント(非壊死性):キイトルーダ
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Lancet 394:1915-1928, 2019.

【点滴の時間】 [day1~]初回105時間30分
 【費用】 編集中
 【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	4	...	21	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○						
2	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:00~	○						
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○						
4	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○						
5	生理食塩液 50mL キイトルーダ点滴静注	1 B 200 mg	側管	30分 フィルター使用	○						
6	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○						
7	生理食塩液 250mL プロイメント点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○						
8	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 1 V	側管	30分	○						
9	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○						
10	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分	○						
11	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 100 mg/m2	側管	2時間 遮光	○						
12	生理食塩液 500mL 5-FU注 13のソルデム3Aと同時に開始	1 B 1000 mg/m2	側管	24時間	○						
13	ソルデム3A 500mL 12の5-FUと同時に開始	1 B	側管	90分	○						
14	ラクテック注 500mL	1 B	側管	9時間 残破棄	○						
15	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	12時間 AM0:00~		○	○				
16	生理食塩液 100mL デカロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分 AM6:00~		○					
17	生理食塩液 100mL デカロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分 AM6:00~			○	○			
18	ラクテック注 500mL	1 B	側管	12時間		○	○				
19	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○				
20	生理食塩液 500mL 5-FU注	1 B 1000 mg/m2	側管	24時間	○	○	○				