【がん種】 尿路上皮癌
【レジメン名】 CBDCA+GEM
【登録番号】 201607
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発：PDまで
【催吐性リスク】 中等度：カルボプラチン、軽度：ゲムシタビン
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：ゲムシタビン, カルボプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 27:5634-5639, 2009.

【点滴の時間】 [day1]3時間、[day8]2時間
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	…	8	…	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○						
	アロキシ静注 0.75mg	1 V									
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A									
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V									
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○						
	ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」	1000 mg/m2									
4	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	1時間	○						
	カルボプラチン点滴静注液「NK」	AUC4.5									
5	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○	○				
6	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ					○		
7	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分					○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V									
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分					○		
	ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」	1000 mg/m2									