【がん種】 尿路上皮癌
【レジメン名】 GC
【登録番号】 201603
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 進行・再発：6コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、軽度：ゲムシタビン
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：ゲムシタビン, シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 17:3068-3077, 2000. J Clin Oncol 23:4602-4608, 2005. Acta Oncologica 47:110-119, 2008.

【点滴の時間】 [day1, 8, 15]2時間、[day2～]73時間
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					1	2	3	4	5	…	8	…	15	…	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○						○		○		
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○						○		○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V													
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○						○		○		
	ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」	1000 mg/m2													
4	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ		○									
5	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	90分		○									
	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	0.4 A		AM8:00～											
6	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分		○									
7	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分		○									
	プロイメンド点滴静注用 150mg	1 V													
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分		○									
	アロキシ静注 0.75mg	1 V													
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A													
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V													
9	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分		○									
10	生理食塩液 100mL	1 V	側管	15分		○									
	ラシックス注 20mg/2mL	1 A													
11	生理食塩液 250mL	1 B	側管	90分		○									
	シスプラチン点滴静注「マルコ」	70 mg/m2		遮光											
12	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分		○									
13	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間　残破棄		○									
14	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間			○	○	○						
				AM0:00～											
15	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分			○								
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V		AM6:00～											
16	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分				○	○						
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	2 V		AM6:00～											
17	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間			○	○							
18	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間			○	○							