

【がん種】 [尿路上皮癌](#)
【レジメン名】 M-VAC
【登録番号】 201601
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 進行・再発:6コースまで(アドリアシン:生涯に500mg/m2まで)
【催吐性リスク】 高度:シスプラチン、中等度:アドリアシン、最小度:メトレキセート、エクザール
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):エクザール(漏出時の冷却禁止,ステロイド局注禁止),アドリアシン、イリタント(炎症性):シスプラチン、ノンビシカント(非壊死性):メトレキセート
【投与量に制限のある薬剤】 アドリアシン:生涯に500mg/m2まで
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 10:1066-1073, 1992. J Clin Oncol 15:2564-2569, 1997. J Clin Oncol 17:3068-3077, 2000. J Clin Oncol 23:4602-4608, 2005.

【点滴の時間】 [day1]1時間15分、[day2~]77時間、[day15, 22]1時間20分
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	2	3	4	5	...	15	...	22	...	28				
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○														
2	生理食塩液 50mL 注射用メトレキセート	1 B 30 mg/m2	側管	15分	○														
3	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ		○													
4	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	90分 AM8:00~		○													
5	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分		○													
6	生理食塩液 250mL プロイメンド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分		○													
7	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分		○													
8	生理食塩液 50mL エクザール注射用	1 B 3 mg/m2	側管	全開		○													
9	生理食塩液 100mL アドリアシン注用	1 B 30 mg/m2	側管	全開		○													
10	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分		○													
11	生理食塩液 100mL ラシックス注 20mg/2mL	1 V 1 A	側管	15分		○													
12	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 70 mg/m2	側管	90分 遮光		○													
13	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分		○													
14	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間 残破棄		○													
15	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間 AM0:00~			○	○	○										
16	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分 AM6:00~			○												
17	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 V	側管	30分 AM6:00~				○	○										
18	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間			○	○											
19	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間			○	○											
20	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ										○		○			
21	生理食塩液 50mL 注射用メトレキセート	1 B 30 mg/m2	側管	15分										○		○			
22	生理食塩液 50mL エクザール注射用	1 B 3 mg/m2	側管	全開										○		○			