

【がん種】 [尿路上皮癌](#)
 【レジメン名】 weekly PTX①毎週
 【登録番号】 201608
 【1コースの期間】 1週間
 【総コース数】 進行・再発:PDまで
 【催吐性リスク】 軽度:パクリタキセル
 【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):パクリタキセル
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 20:937-940, 2002.

【点滴の時間】 [day1]2時間35分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者:アルコール不耐性ではない.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	7
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 パクリタキセル投与30分前	○		
3	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注射用 20mg	1 B 1 A 1 V 1 A	側管	全開 開始時にレスタミン内服	○		
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
5	生理食塩液 250mL パクリタキセル注「NK」	1 B 80 mg/m2	側管	1時間 フィルター使用(DEHPフリー)	○		