

【がん種】 [脳腫瘍](#)
 【レジメン名】 内服TMZ
 【登録番号】 290002
 【1コースの期間】 4週間
 【総コース数】 術後・進行:6コースまで(TMZ+RT終了後から)、再発:2年間まで
 【催吐性リスク】 中等度:テモゾロミド
 【抗がん剤の組織障害性】 -
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 N Engl J Med 352:987-996, 2005. Lancet Oncol 10:459-466, 2009. N Engl J Med 370:709-722, 2014.
 J Clin Oncol 17:2762-2771, 1999. Ann Oncol 12:259-266, 2001. Jpn J Cancer Chemother 33:1279-1285, 2006.

【点滴の時間】 -
 【費用】 編集中
 【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	4	5	...	28		
1	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 テモゾロミド投与1時間前	○	○	○	○	○				
2	テモゾロミド錠「NK」 1コース目 150mg/m ² /日、2コース目 ~200mg/m ² /日 食事の2時間前から食後4時間以内を避ける	- mg/回	内服	1日1回	○	○	○	○	○				