【がん種】	脳腫瘍
【レジメン名】	内服TMZ+Bmab+RT①RT併用期
【登録番号】	290003
【1コースの期間】	10週間（TMZ内服終了後4週間休薬）
【総コース数】	術後・進行：1コースまで（終了後にPDでなければTMZ+Bmab+RT②維持期 を施行する）
【催吐性リスク】	中等度：テモゾロミド、最小度：アバスチン
【抗がん剤の組織障害性】	ノンビシカント（非壊死性）：アバスチン
【投与量に制限のある薬剤】	なし
【主な有害事象】	編集中
【必要な検査】	編集中
【根拠論文】	N Engl J Med 370:709-722, 2014.
【点滴の時間】	[day1]2時間30分、[day15]2時間、[day29, 40]1時間30分
【費用】	編集中
【その他】	対象患者：大きな手術後から28日以上経過している, 2.5mL以上の鮮血の喀血がない. 放射線照射の中断により放射線治療期間が延長した場合には最大day49までテモゾロミド内服可能 リンパ球数減少が出現した場合にはGrade1以下に改善するまでバクタ配合錠を継続する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日																																								
					1	2	3	4	5	…	8	9	10	11	12	…	15	16	17	18	19	…	22	23	24	25	26	…	29	30	31	32	33	…	36	37	38	39	40	…	42	…	70
1	バクタ配合錠	1 錠/回	内服	1日1回食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 テモゾロミド投与1時間前	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3	テモゾロミド錠「NK」 食事の2時間前から食後4時間以内を避ける	75 mg/m2/回	内服	1日1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○												○												○										○						
5	生理食塩液 100mL アバスチン点滴静注用 初回90分、2回目1時間、3回目～30分	1 B 10 mg/kg	側管		○												○												○										○						
6	放射線	2 Gy/回		1日1回	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○						