

【がん種】 [脳腫瘍](#)
 【レジメン名】 内服TMZ+Bmab+RT②維持期
 【登録番号】 290004
 【1コースの期間】 4週間
 【総コース数】 術後・進行：6コースまで(TMZ+Bmab+RT①RT併用期 1コース終了後から開始しSD以上の効果が得られた場合にはTMZ+Bmab+RT③Bmab期 を施行する)
 【催吐性リスク】 中等度：テモゾロミド、最小度：アバステン
 【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性)：アバステン
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 N Engl J Med 370:709-722, 2014.

【点滴の時間】 [day1, 15]1時間30分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者：大きな手術後から28日以上経過している, 2.5mL以上の鮮血の喀血がない.

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|------|----------------------|-----|---|---|---|---|-----|----|-----|----|---|--|--|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 15 | ... | 28 | | | | |
| 1 | カイトリル錠 2mg | 1 錠/回 | 内服 | 1日1回 テモゾロミド投与1時間前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 2 | テモゾロミド錠「NK」 1コース目 150mg/m ² /日、2コース目～200mg/m ² /日 食事の2時間前から食後4時間以内を避ける | - mg/回 | 内服 | 1日1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 250mL | 1 B | メイン | キープ&フラッシュ | ○ | | | | | | | | | ○ | | | |
| 4 | 生理食塩液 100mL アバステン点滴静注用 | 1 B 10 mg/kg | 側管 | 30分 | ○ | | | | | | | | | ○ | | | |