【がん種】 脳腫瘍
【レジメン名】 注射TMZ
【登録番号】 290008
【1コースの期間】 4週間
【投与間隔調整規定】 −2日
【総コース数】 術後・進行:6コースまで(TMZ+RT終了後から)、再発:2年間まで
【催吐性リスク】 中等度:テモダール
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):テモダール
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、疲労、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚不全、下痢、便秘、脱毛

【必要な検査】 一般採血
【根拠論文】 N Engl J Med 352:987-996, 2005. Lancet Oncol 10:459-466, 2009. N Engl J Med 370:709-722, 2014.
J Clin Oncol 17:2762-2771, 1999. Ann Oncol 12:259-266, 2001. Jpn J Cancer Chemother 33:1279-1285, 2006.
【点滴の時間】 [day1～5]4時間10分
【その他】 ^

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 28 |
| 1 | 生理食塩液 250mL | 1 B | メイン | キープ＆フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | グラニセトロン点滴静注液バッグ 3mg/100mL | 1 B | 側管 | 30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | 生理食塩液 50mL | 1 B | 側管 | 全開 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 4 | 生理食塩液 250mL | 1 B | 側管 | 90分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | テモダール点滴静注用 | − mg/m2 | | | | | | | | | |
| | 蒸留水 100mL | 1 B | | テモダール溶解用 | | | | | | | |
| | 調製開始から14時間以内に投与終了 | | | | | | | | | | |
| | 1コース目150mg/m2/日、2コース目～200mg/m2/日 | | | | | | | | | | |